

Mathematisches Institut der Universität Heidelberg

Prof. Dr. Rainer Weissauer / Dr. Uwe Weselmann

## Übungen Funktionentheorie 2 SS 10 Blatt 10

Abgabe bis Di 29.06.10 um 11:00 Kasten links neben HS 6

**Aufgabe 29)** Sei  $D \subset \mathbb{C}$  ein Elementargebiet,  $S = \{z_1, \dots, z_n\} \subset D$  endlich und  $X = D - S$ . Zeige, dass  $X$  eine offene Überdeckung durch zwei Elementargebiete  $X = U_1 \cup U_2$  besitzt, so dass  $U_1 \cap U_2$  disjunkte Vereinigung von  $n + 1$  Elementargebieten ist.

*Tipp:* Reduziere zuerst auf die beiden Fälle  $D = \mathbf{E} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$  und  $D = \mathbb{C}$ , und zeige anschließend, dass man zusätzlich noch  $\operatorname{Re}(z_\nu) \neq \operatorname{Re}(z_\mu)$  für  $\nu \neq \mu$  annehmen kann. Danach konstruiere man  $U_1$  und  $U_2$  so, dass  $U_1 \cap U_2 = \{z \in D \mid \operatorname{Re}(z) \neq \operatorname{Re}(z_\nu) \text{ für } \nu = 1, \dots, n\}$  gilt.

(3 Punkte)

**Aufgabe 30)** (a) Sei  $\mathcal{G}$  eine Garbe auf dem topologischen Raum  $X$  und  $\mathcal{U} = \{U_1, U_2\}$  eine offene Überdeckung von  $X$ . Zeige, dass man eine exakte Sequenz hat:

$$0 \rightarrow \mathcal{G}(X) \rightarrow \mathcal{G}(U_1) \oplus \mathcal{G}(U_2) \xrightarrow{d} \mathcal{G}(U_1 \cap U_2) \xrightarrow{R} H_{\mathcal{U}}^1(X, \mathcal{G}) \rightarrow 0$$

mit  $d(f_1, f_2) = r_{U_1 \cap U_2}^{U_1}(f_1) - r_{U_1 \cap U_2}^{U_2}(f_2)$  und einer geeignet zu definierenden (!) Abbildung  $R$ .

(b) Berechne  $H_{\mathcal{U}}^1(X, \mathcal{G})$  in den folgenden Fällen:

(b1)  $X$  und  $U_1, U_2$  wie in Aufgabe 29),  $\mathcal{G} = \mathbb{Z}_X$  die konstante Garbe;

(b2)  $X = \mathbb{C}^*$ ,  $\mathcal{G} = \mathcal{O}$ ,  $U_1 = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z| < 2\}$ ,  $U_2 = \{z \in \mathbb{C} \mid 1 < |z|\}$ .

(5=3+1+1 Punkte)

**Aufgabe 31)** (a) Zeige: Ist  $f : \mathbf{H} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$  eine meromorphe Funktion mit  $f(z+1) = f(z)$  für  $z \in \mathbf{H}$ , so gibt es eine meromorphe Funktion  $g : \mathbf{D}^* \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$  mit  $f(z) = g(e^{2\pi iz})$ . Hierbei ist  $\mathbf{D}^* = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z| < 1\}$ .  $f$  ist genau dann holomorph in  $\mathbf{H}$ , wenn  $g$  holomorph in  $\mathbf{D}^*$  ist.

(b) Ist  $g$  im Nullpunkt meromorph von der Ordnung  $n \in \mathbb{Z}$ , so setzen wir  $ord_\infty(f) = n$ . Zeige in diesem Fall:

$$ord_\infty(f) = \frac{1}{2\pi i} \cdot \int_a^{a+1} \frac{f'(z)}{f(z)} dz, \quad \text{wobei}$$

man entlang der Verbindungsstrecke integriert und wobei  $a \in \mathbf{H}$  so gewählt ist, dass  $f$  keine Pole im Bereich  $Im(z) \geq Im(a)$  hat.

(3=1+2 Punkte)

**Aufgabe 32)** (a) Sei  $f : \mathbf{H} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$  eine meromorphe Funktion, die der Gleichung aus Aufgabe 28)b) genügt. Für  $z \in \mathbf{H}$  setzen wir

$$\widetilde{ord}_z(f) = \frac{2}{\#(\Gamma_z)} \cdot ord_z(f)$$

mit  $\Gamma_z$  aus Aufgabe 9). Mit dem  $D$  aus Aufgabe 5) zeige man:

$$ord_\infty(f) + \sum_{z \in D} \widetilde{ord}_z(f) = \frac{k}{12}.$$

*Tipp:* Man wende den Residuensatz auf  $\frac{f'}{f}$  an, wobei man entlang eines Weges integriert, der eine geeignete Modifikation des Randes von  $D$  ist, und benutzt 28)e) für die Integralauswertung.

(b) Folgere, dass  $E_4$  und  $E_6$  (Aufgabe 28) außer bei  $\rho$  bzw.  $i$  keine weiteren Nullstellen haben.

(5=4+1 Punkte)